

Informovaný souhlas

LIP LIFT (BULLHORN LIP LIFT)

Základní informace

Lip Lift je plasticko-chirurgický výkon, u kterého dojde k přirozenému zvětšení rtu a upravuje se neestetická vzdálenost mezi nosními dírkami a rty, tzv. filtrum. Esteticky ideální vzdáleností je 1 - 1,2 cm u žen a 1,5 cm u mužů - měřeno mezi středem nosních dírek a rty. Viditelnost horních zubů při mluvení nebo při mírně pootevřených ústech je dalším znakem mladé a krásné tváře. Větší vzdálenost v této oblasti navíc často vytváří tzv. "přísný vzhled stažených rtů". Tato metoda je tedy vhodná jak pro starší klienty, u kterých se stářím vzdálenost mezi nosem a rty neesteticky prodloužila, tak pro mladší klienty, kteří mají tuto delší vzdálenost geneticky danou. Touto metodou se přirozeně zvětší horní ret, který se věkem „vtáčí“ nebo je genetickou predispozicí úzký. Zkrácením rozměru nad horním rtem vytvoříme hezkou změnu v obličeji - ret a přední zuby budou v dobré estetické pozici, horní ret přirozeně mírně zvětšíme. Tvář zkrásní a bude působit mladistvě. Jizvy po operaci jsou výsledkem individuálního hojení, které neumíme nijak ovlivnit, neboť se jedná o genetickou vlohu. Po operaci jsou jizvy růžové až červené, někdy tuhé a necitlivé. Postupně však dochází k jejich zrání a stávají se jemnými a bledými. Tento proces trvá asi půl roku. Předpokladem pro provedení lip liftu je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav.

Pokyny před operací

- V den operace můžete dle zvyklostí jíst i pít. Nejpozději však 1 hodinu před zákrokem.
- Při konzultaci před plánovaným zákrokem, nahlášte lékaři nebo zdravotní sestře vaše alergie a léky, které trvale užíváte! Při alergii na léky nebo chemikálii (dezinfekci), potřebujeme znát alergen-látku, která vaši alergickou reakci způsobuje!
- Pacient je povinen nahlásit plastickému chirurgovi užívání všech přípravků léčivých i doplňkových před plánovanou operací!
- Nejméně jeden měsíc před operací nesmíte užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Tato ovlivňuje negativně krevní srážlivost a mohla by pak způsobit pooperační krvácení! Jsou to například: Acylpyrin, Acylkofin, Aspro, Alnagon, Brufen. Nejméně jeden měsíc před operací

nesmíte užívat enzymatické preparáty typu Wobenzym, Phlogenzym a vysoké dávky vitamínu C v preparátech, také z důvodu pooperačního krvácení!

- Na operační zákrok se dostavte bez líčení, umělých řas a bez šperků. Vše uvedené může být zdrojem infekce a zkomplikovat hojení ran po zákroku.
- Na operační zákrok se dostavte v pohodlném oblečení a obuvi, pro snadné obléknutí a obutí se po zákroku.
- Před zákrokem a 6 týdnů po zákroku nekuřte! Kouření velmi zpomaluje a komplikuje hojení ran!
- Zajistěte si odvoz po zákroku. Sami neřidte!

Operační výkon, průběh zákroku a péče o jizvy

Samotný operační zákrok trvá cca 45 minut. Vyjmutí nevstřebatelných stehů po zákroku je zpravidla za 7 dní. Termín první kontroly a vyjmutí stehů domluvíme ihned po operaci v naší ambulanci. Klientky ze zahraničí nebo z daleka si mohou domluvit vyjmutí stehů v chirurgické ambulanci v místě bydliště.

Operačnímu výkonu předchází přijetí v ambulanci, podepsání smlouvy a informovaného souhlasu, platba zákroku, rozhovor s lékařem a zdravotní sestrou, pořízení fotografie před zákrokem. Pacientovi jsou podány tyto léky (1tbl./500mg Novalginu nebo 1tbl./100mg Ketonalu, 1tbl. /1,5mg Lexaurinu). Operace se provádí na zákrovém sálku. Na sálek přichází pacient ve svém spodním prádle a v jednorázovém prádle (operačním župánku, pokrývce hlavy, přezůvkách). Před výkonem chirurg vyměří a nakreslí hranice řezů na kůži. Poté je aplikována do očí oční mast Ophthalamozulen, kvůli ochraně očí před dezinfekcí obličeje. Po aplikaci oční masti již zůstanou oči během celého zákroku zavřené. Lékař i sestra informují pacienta o úkonech, které právě provádí a chystají se provést během operace. Následuje dezinfekce obličeje a aplikace lokálního anestetika injekční metodou a bezbolestný zákrok při, kterém lékař odstraní nadbytek kůže a ránu sešije, podkoží vláknem vstřebatelným a kůži vláknem nevstřebatelným. Jizvy jsou schovány v rýze nosních dírek. Rána je překryta stripy a sterilním krytím. Po výkonu přetrvává krátce rozostřené vidění z důvodu aplikace oční masti před výkonem. Lze použít umělé slzy nebo borovou vodu na proplach očí. Po operaci je pacient propuštěn s doprovodem do domácí péče.

Pooperační období

První 3 dny po operaci dodržujte klidový režim, běžné činnosti jsou možné. Ochrana před UV zářením, pozor i na silné mrazy.

První 3 dny po zákroku očekávejte bolestivost a citlivost kolem rány.

Po zákroku počítejte s otokem v oblasti nosu a rtů, který přetrvává většinou 7 dní.

Sterilní krytí (čtverce) můžete odstranit již druhý den po zákroku.

Stripy ponechejte na ráně 3 dny. Po jejich sejmutí, dezinfikujte ránu po každém jídle. Pro urychlení hojení a ústup otoku, doporučujeme chladivé obklady. Gelové polštářky, chladivé odvary z řepíku lékařského, obklady z mraženého hrášku, který vložíte do malých pytlíčků. Nedávejte je přímo na kůži, ale pod tenkou textilii. Otoky a modřiny v pooperačním období jsou normální a bývají přítomny. Tyto jevy se objevují jako běžná reakce na operaci i při maximální péči a opatrnosti operatéra.

Doporučené léky a přípravky

(Pokud u vás dojde k alergické reakci při užívání doporučených léků a přípravků, okamžitě ukončete jejich užívání a kontaktujte nás na telefonu: 777 456 961/ 777 456 954).

Tyto přípravky můžete zakoupit na naší klinice.

- **Betadine roztok** pro dezinfekci pooperačních ran.
- **Betadine** - mast. (Po dezinfekci roztokem, ošetřete jizvy mastí).
- **Analgetika** - Novalgin, Ketonal, Aulin, Nimesil, Algifen, Surgam, Paralen, Panadol (První 3 dny se užívají po 6-8 hodinách, dále dle bolesti). Vyhněte se ibalginové řadě analgetik, vedou ke zvýšené krvácivosti.
- **Chladivé obklady** z řepíku lékařského (2x denně na 15 minut), chladivé gelové masky nebo mražený hrášek v mikrotenovém pytlíčku, první tři dny chladit intenzivně, neustále.
- **Lipoelastic** - silikonový gel na jizvy. (Aplikace je možná až na klidné a zahojené jizvy, po vytažení stehů a vyloupenutí stroupků). Doporučujeme začít aplikovat nejdříve 14 dní po zákroku. Nesmí přijít do očí!

V ceně zákroku je zahrnuta

- Premedikace (podání analgetik a léku na zklidnění před operací).
- Lokální anestezie.
- Operace.
- Pooperační péče (dvě pooperační kontroly, odstranění stehů).

Kontrola u lékaře

- První kontrola u lékaře a vyjmutí stehů za 7 dní po operaci, druhá kontrola za 3 měsíce.
- V případě potíží, potřeby dřívější kontroly či konzultace v pooperačním období nás kontaktujte.
- Telefon: 777 456 961 nebo 777 456 954.