

Informovaný souhlas

LIP LIFT (BULLHORN LIP LIFT)

Základní informace

Lip Lift je plasticko-chirurgický výkon, u kterého dojde k přirozenému zvětšení rtu a upravuje se neestetická vzdálenost mezi nosními dírkami a rty, tzv. filtrum. Esteticky ideální vzdáleností je 1 - 1,2 cm u žen a 1,5 cm u mužů - měřeno mezi středem nosních dírek a rty. Viditelnost horních zubů při mluvení nebo při mírně pootevřených ústech je dalším znakem mladé a krásné tváře. Větší vzdálenost v této oblasti navíc často vytváří tzv. "přísný vzhled stažených rtů". Tato metoda je tedy vhodná jak pro starší klienty, u kterých se stářím vzdálenost mezi nosem a rty neesteticky prodloužila, tak pro mladší klienty, kteří mají tuto delší vzdálenost geneticky danou. Touto metodou se přirozeně zvětší horní ret, který se věkem „vtáčí“ nebo je genetickou predispozicí úzký. Zkrácením rozměru nad horním rtem vytvoříme hezkou změnu v obličeji - ret a přední zuby budou v dobré estetické pozici, horní ret přirozeně mírně zvětšíme. Tvář zkrásní a bude působit mladistvě.

Pokyny před operací

- V den operace můžete dle zvyklostí jíst i pít. Nejpozději však 1 hodinu před zákrokem.
- Při konzultaci před plánovaným zákrokem nahlašte lékaři nebo zdravotní sestře vaše alergie a léky, které trvale užíváte!
- Nejméně jeden měsíc před operací nesmíte užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Tato ovlivňuje negativně krevní srážlivost a mohla by pak způsobit pooperační krvácení!
Jsou to například: Acylpyrin, Acylkofin, Aspro, Alnagon, Brufen a pod.
Nejméně jeden měsíc před operací nesmíte užívat enzymatické preparáty typu Wobenzym, Phlogenzym či vitamín C (i v preparátech), také z důvodu pooperačního krvácení!
- Na operační zákrok se dostavte bez líčení a bez veškerých šperků. Vše uvedené může být zdrojem infekce a zkomplikovat hojení ran po operačním zákroku.
- Na operační zákrok se dostavte v pohodlném oblečení a obuvi, pro snadné obléknutí a obutí se po zákroku.
- Před zákrokem a 6 týdnů po zákroku nekuřte! Kouření velmi zpomaluje a komplikuje hojení ran!
- Zajistěte si odvoz po zákroku.

Operační výkon a průběh zákroku

Samotný operační zákrok trvá přibližně 45 minut.

Operačnímu výkonu předchází přijetí v ambulanci, podepsání smlouvy a informovaného souhlasu, platba zákroku a rozhovor s lékařem a zdravotní sestrou. Pacientovi jsou podány tyto léky (1tbl. Novalginu, 1 tbl. Lexaurinu). Operace se provádí na zákrovém sálku. Na sálek přichází pacient ve svém spodním prádle a v jednorázovém prádle (operačním župánku, pokrývce hlavy, přezůvkách). Před výkonem chirurg vyměří a nakreslí hranice řezů na kůži. Poté je aplikována do očí oční mast, kvůli ochraně očí před dezinfekcí obličeje. Po aplikaci oční masti již zůstanou oči během celého zákroku zavřené. Lékař i sestra informují pacienta o úkonech, které právě provádí a chystají se provést během operace. Následuje dezinfekce obličeje a aplikace lokálního anestetika injekční metodou a bezbolestný zákrok při, kterém lékař odstraní nadbytek kůže a ránu sešije. Jizvy jsou schovány v rýze nosních dírek. Rána je překryta stripy a sterilním krytím. Po operaci je pacient propuštěn do domácího ošetřování.

Pooperační období

Po zákroku počítejte s otokem v oblasti nosu a rtů, přetrvává většinou 7 dní.

Stripy ponechte celý týden. Odstraníme je společně se stehy 7 den po zákroku. Sterilní krytí(čtverce) můžete odstranit již druhý den po zákroku. Ránu dále kryjte náplastí s polštářkem.

Určitá bolest se objeví s odstupem čtyř až osmi hodin po výkonu, jak odezní účinek anestetika.

První 3 dny po operaci dodržujte klidový režim, běžné činnosti jsou možné. Ochrana před UV zářením, pozor i na silné mrazy.

Pro urychlení hojení a ústup otoku, doporučujeme chladivé obklady. Gelové polštářky, chladivé odvary z řepíku lékařského, obklady z mraženého hrášku, který vložíte do malých pytlíčků. Nedávejte je přímo na kůži, ale pod tenkou textilii. Otoky a modřiny v pooperačním období jsou normální a bývají přítomny. Tyto jevy se objevují jako běžná reakce na operaci i při maximální péči a opatrnosti operátora.

Doporučené přípravky

- Betadine roztok pro dezinfekci pooperačních ran.
- Betadine mast pro ošetření pooperačních ran.
- Analgetika - Novalgin, Aulin, Nimesil, Algifen, Surgam.
- Chladivé obklady (gelové polštářky, obklady, mražený hrášek).

V ceně zákroku je zahrnuta

- Premedikace (podání analgetik a léku na zklidnění před operací).
- Lokální anestezie.
- Operace.

- Pooperační péče (dvě pooperační kontroly, první kontrola a odstranění stehů za 7 dní, druhá kontrola je možná za 3 měsíce).
- V případě potřeby kontrola i dříve po telefonické konzultaci.
Darina Honomichlová – vedoucí zdravotní sestra, tel. : 777 456 954.

Úhrada zákroku

Zálohu 5000 Kč uhradte převodem, minimálně 3 dny před zákrokem na účet : 244 709 390/0300.
Platbu doplatku v hotovosti před operačním zákrokem na klinice Plastika Richtr.

V Plzni _____2021

Podpis klienta :